

Psychische Komorbidität und psychosoziale Versorgung nach Kehlkopfteilresektion

Singer, Meyer, Wollbrück, Danker, Schwarz

Abt. Sozialmedizin

Universität Leipzig

Laryngektomie - Kehlkopfteilresektion



Stand der Forschung

	N	Angst- störung	Depres- sion	Alkoholis- -mus	psychisch krank gesamt
Dt. Bevölkerung (Männer) ¹	2050	1%	5%	4%	16%
Tumorpatienten im Akutkrankenhaus ²	689	15%	11%	5%	32%
HNO- Tumorpatienten nach Operation ³	107	0%	4%	6,5%	36%
Laryngektomierte 4,5,6	5-10	ohne Angabe	40-60%	ohne Angabe	67-80%

¹Jacobi, 2004; ² Krauß, 2004; ³ Kugaya, 2000; ⁴ Davis und Beumont 1973; ⁵ Byrne et al. 1993; ⁶ Gibson und McCombe 1999

Ergebnisse Querschnittsstudien

	Nach Laryngektomie	%	Nach Teilresektion	%	Gesamt	%
Keine Diagnose	131	78.0	116	82.9	247	80.2
Schwere Depression	11	6.5	5	3.6	16	5.2
Leichte Depression	9	5.4	5	3.6	14	4.5
Soziale Phobie	1	0.6	0	0.0	1	0.3
Posttraumatische Belastung	0	0.0	1	0.7	1	0.3
Generalisierte Angst	2	1.2	4	2.9	6	1.9
Anpassungsstörung	6	3.6	8	5.7	14	4.5
Alkoholabhängigkeit	8	4.8	1	0.7	9	2.9
Depression (gesamt)					30	9.7
Psych. Erkrankung (gesamt)					61	19.8
Gesamt	8		140		308	100

in psy. Behandlung: N=5

Instrument: SKID


zum Vergleich

	N	Angst- störung	Depres- sion	Alkoholis- -mus	psychisch krank gesamt
Tumorpatienten im Akutkrankenhaus ²	689	15%	11%	5%	32%
HNO- Tumorpatienten nach Operation ³	107	0%	4%	6,5%	36%
Laryngektomierte ^{4,5,6}	5-10	ohne Angabe	40-60%	ohne Angabe	67-80%
Laryngektomierte Ø 6 Jahre nach OP	168	2%	12%	7%	22%
KTR Ø 6 Jahre nach OP	140	4%	7%	1%	17%

Projektprofil

- Laufzeit: 08/2007 bis 07/2010
- Längsschnitterhebung mit vier Messzeitpunkten
- multizentrisch angelegte Studie
- Datenerhebung in persönlichen Gesprächen
- Persönliches Interview und standardisierte Fragebögen
- angestrebter Stichprobenumfang: $N = 220$

Studiendesign



HNO-Klinik

zu Hause bei den Patienten

Instrumentenauswahl

Variablen/Konstrukt	Instrumente
Lebensqualität	EORTC QLQ-C30 EORTC QLQ-H&N35, VAS
Psychisches Befinden	HADS, Hornheider FB
Psychische Komorbidität	SKID
Progredienzangst	PA-F
Soziale Unterstützung	F-Sozu
Partnerschaftsqualität	PFB
Sprechqualität	PLTT